

**DISSERTATIO  
INAUGURALIS  
MEDICA DE  
MENINGITIDE  
QUAM...**

---

Demetrius Demetter



DISSERTATIO  
 INAUGURALIS MEDICA  
 DE  
 MENINGITIDE  
 QUAM  
 PUBLICAE DISQUISITIONI  
 SUBMITTIT  
 DOMINICUS DOMINICUS  
 GROATA ZAGREBIENSIS



PATAVII  
 TYPIS CARTALLIER  
 MDCCLXXVI



*Famula*

Qui vero ea, quae ab aliis sunt inventa inhumanorum  
verborum articulo contumaciter contemnit neque quid-  
quam corrigi, sed a parvis inventa apud imperitos  
tradere, in hunc prodentiae existimationem fieri velle  
non videtur, sed potius naturam suam aut ignoran-  
tiam malitiae prodere. Solis enim artium ignavis hoc  
opus competit, qui ambitionis quidem contendunt, ne-  
que tamen ingrebitate sua ulla modo procedere pos-  
sunt, ut aliorum opera vel recta calumniantur, vel non  
recte reprehendant.

ELUCACIUS DE ARTIBUS.

MANEUS  
PIE DEFUNCTI PATRIS  
IN AETERNAE GRATITUDINIS  
MONUMENTUM  
HAS CONSECRAT PAGELLAS

AUCTOR.



## PRÆFATIO

---

**I**nter morborum casus, quos tractare cuilibet medicinae practicae studioso suprema imponit lex, anno præterito in Clinica medica Patavina curæ meae commissos, casus quoque, summa attentione dignus, inflammationis membranarum Cerebri occurrit; tam hujus periculo pleni morbi lætissimus exitus, quam summam doctrinam spirantis nostri expertissimi vastissimaque scientia ornati admodum colendi Domini Professoris Lippich, in Quem semper, quæ nos in arduæ medendi artis mysteria introducere conabatur, solitudinis assiduæ laud immemor, gratissimo ducar animo, ad aegri lectulum observationes, ad per-

scrutanda, quae de hoc objecto tractant, opera mentem meam incitarunt.

Hoc fine scripta haud pauca medicorum praecipue nationis Gallicae, quae laboribus pretiosis circa praedictam materiam praeter caeteris gloriatur, attento pervolvi animo. Sed intravi Labyrinthum inextricabilem, ex quo exitum vix tetigissem, si clararum monitionum, quas fortunatus toties ex ore paucis ante cum merita laude nominati viri in suis praelectionibus audiendi occasionem habui, memor non fuisset.

Divergentes auctorum opiniones, quae in objecto tam subtili, et paucis tantum abhinc rite tractato annis, neminem, quem cursus detectionum scientificarum non latet, miratione implebant, secundum nostrae scientiae sanissima principia, quantum meae tenuissimae vires concesserunt, adaequate et systematice ordinare conabar.

Non ignoro, hunc meum laborem valde imperfectum esse; nam votis vires non re-

sponderunt; nāhūlominus tamen, Professores doctissimi, Vestram paternam indulgentiam, quae verae sapientiae atque eruditionis est proprietas principalis, cognoscens, hoc laeve opusculum pro adipiscenda in medicina Laurea exaratum, Vestro profundo criterio devotissime proponere audeo. Qui, uti Vos, viri clarissimi, scientiae nostrae scopulis syrtisque plenum nescit pelagum, nunquam a tyrone completam artis peritiam, et dexteritatem, quae protractis tantum studiis et experientia multorum annorum conquirentur, expostulabit.

---



187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

## INTRODUCTIO

**S**trictior determinatio sedis morborum ad noberrimos spectat arduorum conaminum aevi nostri medicorum fructus. Vix hodierna die sufficit, ut morbi natura tantum medico pateat; sed quo in puncto ejus fomes, et e quo per organismum dissipatur, centrum stricto definire quoque interest, quoniam quotidiana edocti sumus experientia, omni quo die de hac veritate certiores redimur, quibus therapia circumdata est, tenebras fugandi hoc unicum existere medium, et claudicanti scientiae fulcrum præbere, quo destituta vix unquam desideratam par quæst attingere metam. Faventibus circumstantiis, Pharmacologia ad eum pervecta perfectionis gradum, ut præter, quæ medicamenta in corpus humanum introducta provocant, effectuum notionem alacriorem, medico illam quoque cognitionem, quæ imbuta mentem ejus proprius, quæ pharmaca prædita sunt, in diversas organismi partes earumque involvenda agendi nixus, amplius non fugit, superdici in statu facit, tunc solummodo a sedis

morbi stricta definitione, ut vitæ deleatur inimicus, dependebit.

Hæc pauca, ad demonstrandum strictam subtilem atque usque ad limum perscrutantem fundam artem diagnosticam nullatenus, uti eam multis egregie empiricorum nominare non displicet superfluum luxum scientificum, sed, etiam hodierno tempore propter, in quo pharmacologia adhuc versatur, cultoræ gradum infirmum non tam magnæ, in multis tamen casibus nullatenus spernendæ, pro futuris autem temporibus, quæ majorem, uti sperandum est, super scientiæ spargent lucem, summas esse practicas dignitatis, sufficient.

Contra indigna et reuera barbara illa multorum practicoꝝ, omne inventum et quancunq; detectionem, quæ illis displicent, in germine annihilandi, et quod me Horcæ lugubre est, nonnullorum quoque vicerum, qui scientiæ, ingenio, nec non publicis, quibus fruuntur, officiis et honoribus convocati sunt, ut quibus obliuiscatur scientiæ nostræ coelum, nubes disipent, aut ex leso amore proprio aut quadam aliâ, ab omni scientiæ nostræ sincero amico certe condemnanda animi proprietate; omnia, quæ ipsimet non inveniunt et proferunt, iniquè ad artis nostræ detrimen- tum sarcasmis, quæ hæud raro a plorbe scienti- fics pro oraculis tenentur prosequendi et rejicien- di, ex privatisque respectibus qui hucusque hæud

unicam tentum extinguerunt scintillam, quae sola in radum, multas forsan tam obscuras scientiae regiones perbustraturum, concreveret, Egyptianae conservandi tenebris, consumina, eximius Professor Sachs, qui merito inter primos aevi hujus scientiae medicae cultores numeratur, in sui laudatissimi operis Lipsiae anno 1839 sub titulo: *Enchiridii systematis naturalis medicinae practicae idiomate Germanico editi, Tomi primi sectione secunda, pagina 106, et paragrapho 65, sequentia observat: "Valde majoris significationis erat consuevit Phrenitidem a Meningitide separandi; postquam vero hujusce successus suis premeretur difficultatibus, principium Inseparabilitatis eorum profertur et auctoritate multorum magnorum medicorum comprobatum fuit".* Attentione vero ad morbos medullae spinalis iterum versa, passus a quo universa medicina lucrum summum obtinere potuisset et deberet, fuit, ipsemet ille summus medicus P. Frank a quo haec motio originem sumpsit, primus, qui inflammationem cerebri, cerebelli, medullae oblongatae nec non ejus involucrorum omnium *Inseparabilem* declaravit, quiescentes practici consilabantur hac identitatis declaratione, cum omni in causa therapia tamen eadem maneat. Quomodo quaeque, antequam particularitas et diversitas morbi praedicatae notas succint, similis sciri possunt? Revera haec praecox conclusio haud

firmiter fundamentò et majori veritate, quam quondam inceptam illud, doctrinam Splenitidis sequenti declaratione adimplendi: illam cum morbum letus sinistri, qualem hepatitidem letus dextri esse, fulcitur. Cum vero recentioribus temporibus inflammatio Arachnoideae sollicitarem investigationum (praecipue apud Gallicos medicos) objectum sisteret, evenit, ut omnia, quae prius sine ratione pro Phrenitide tenebantur, nunc modo non minus injusto pro Arachnoitide teneantur. Quando ante nonnulla decennia crebra atque pandemica apparitio typhi contagiosi ad speciem ejus investigationem medicos cogisset, et illam comitans visceris cranii affectio inflammatoria detecta fuisset; erant multi, Marco praecurso, prompti ad Typhum contagiosum pro Encephalitide proclamandum. His omnibus illoc persectum est, ut nostris temporibus apud Germanicae nationis medicos, omnis et quaecumque inter Crani et Columnae vertebrales cavitates inflammatio sub nomine Encephalitidis intelligatur, apud Gallicos medicos vero e contra nomine Arachnoitidis haec chaotica significatio tribui videtur; sed strictioris separationis meritum sine dubio praes omnibus aliis nationi Gallicae debetur (1).

(1) Hinc splenitidis pleurae nationi, cui me Herdæ injuste e multis insipiditatis in rebus scientificis imputatur, medicinae moderatae salutaris haud unum solum ad perficienda

Celeberrimus Rostan in sui ab academia scientiarum Parisiensi coronati sub titulo: *Cours de médecine clinique* ect. Brunellii anno 1852, jam tertia vice editi operis pagina 182 circa hoc objectum sequentia annotat « les recherches d'ana-  
 » tomie pathologique m'ont souvent convaincu  
 » de l'existence de la meningite indépendante  
 » de l'encéphalite, de même qu'elles démontrent  
 » l'existence de la pleurésie, de la péritonite ect.  
 » indépendant de la pneumonie, de la gastroen-  
 » terite etc. Il ne serait donc pas sans importan-  
 » ce de chercher quelles sont les nuances, qui  
 » peuvent les faire distinguer l'une de l'autre.  
 » Sous le rapport du pronostic, je crois que  
 » cette distinction doit être très intéressante, car  
 » il n'y<sup>a</sup> pas de doute qu'une inflammation  
 » bornée aux membranes ne soit infiniment  
 » moins dangereuse que celle qui attaque le tis-

suum semperque, la scientia Hippocratica omne pon-  
 ctum ferens, artis diagnosticæ edificium debet; — in  
 memoriam schemata inter tantas alias omnes huius  
 sapientis Stethoscopi inventio, de cujus applicatione  
 summa utilitate et necessitate in morbis thoracis, nec  
 non de incredibili auiditate vel malitia illorum virorum,  
 quæsecundia non arabescunt, coram mundo tam eviden-  
 tem neque veritatem millennis vicibus in Clinica medica  
 superiore hujus Universitatis persuasi saltem, in memo-  
 riam revocet, et sine omni dubio paulo ante promer-  
 citas venturas applaudet.

« au même d'un organe tel que le cerveau. » Ex quibus clare elucet, quoque hanc summum medicum opinionis esse, a separatione inflammationis cerebri ab illa ejus involuorum pro medicina maximum nasciturum lucrum.

Ille paucae observationes, ut hinc praefigantur opusculo necessariae videbantur, ne objectum, quod pro dissertatione inaugurali a me electum fuit, qua nullius practicae utilitatis condemnatur; nam maxima praecipue aeri praesentis medicorum pars, in quorum verba jurare, practicum modernorum haud parvus numerus consuevit, erroneam inseparabilitatis praedictorum morborum opinionem defendit.

#### DE NOMINATIONE, DEFINITIO ET SEDIS SITUS.

Inflammatio involuorum cerebri, Cerebelli et medullae spinalis medicis modernis scientifico nomine Meningitis audit, denominatio, quae a graeco vocabulo *μηνίξ*, *menyix*, quod quaecumque cuticulam, κατ' ἐξῆς vero involucri cerebri et medullae spinalis denotat, et a particula finali *itis* quae longae consuetudinali lege sancita inflammationem designat, composita est. Hippocrates videtur sub nomine *Οἰήμας ὀρυπακός* eundem subintelligisse morbum, sed in significatione magis chaotica, uti in scientiae nostrae aurore evenire debuit. Angli cum Florenty, et Brain-

fever, secundum vero Mason, Good varietatem speciei empyematia cephalitidis nuncupant; Germani Hirnhautentzündung vocant; Itali Meningite nominant; Galli tandem Mengite et secundum Fasel, Phrenex appellant; a multis vero hujus nationis medicis nomina: *fièvre maligne, fièvre ataxique, fièvre cérébral, hydrocephal aigue, apoplexie encéphale, apoplexie meninge et arachnitis* pro synonymis ejusdem conceptus sed sine ratione tenentur.

Quoniam cuticulae cerebri et medullae spinalis tam arcto connubio inter se pendent, ut in cadaveribus summa difficultate ab invicem separari queant, illarum inflammationes ab invicem distinguere velle onus inutile esse, cum nulla symptomata, quibus cognosci possent, adsint, et propter tam strictam inter se connubium et quae praeditae sunt, communem functionem haud non semper medicorum sagient mentem; quare *sub meningitide inflammatio omnium involuorum cerebri, Cerebelli et medullae spinalis subintelligitur.*

Ex praedictis elucet, a multis praecipuis nationis Gallicae medicis tractatam Arachnoidem, quae revera rarissime substantive apparet, sed semper cum inflammatione cacterarum membranarum cerebri conjuncta vis est, ad minus logicas spectare divisiones, et cum symptomata illam concomitantia ab illis meningitidis respte haud



différant, omni practica utilitate ejus doctrinam destitutam esse; nam etiamsi Parent et Martinet ad Arachnoiditidis symptomata soporem et paralytim, proprietates, quas revera, uti inter alios celeberrimi atque expertissimi Sauvage, Lallemand et Rostan ad evidentiam demonstrarunt, encephalitidem exclusive comitantur, et ejus symptomata plane pathognomica, quibus inflammatio haec ab illa distinguitur, astant, referant, nihilominus tamen opinionem nostram detractis e numerosis a tot clarissimis viris institutis cadaverum sectionibus, e quibus eluxit praedicta symptomata saltem Encephaliditi propria esse, resultatis fulciti, illorum assertionem, qui contraea defendunt pro summe erronea declarantes, nunquam relinquemus.

Persuasi igitur sumus auctororum duorum auctororum assertionem vel supra falsam diagnosim fundatam, vel confusionis morbi hujus cum ejus effectibus (nam sopor et paralytis ab exuberante quantitate lymphæ effusae, quae meningum inflammationem sequi solet, dependere quoque potest), fractum esse.

In scriptis caeteroquin horum medicorum, uti ex observationibus ab eximio Doctore Georget circa haec institutis loculenter emanat, tanta falsa inveniantur, ut illis vix fides tribuenda sit. Sic exempli gratia illi asserunt: in Arachnoidide arachnoidem saepissime leviter solummodo praer-

cipue in comparatione cum morbois cerebri et pie matri mutationibus, alteratam observasse. Porro inter 117 Arachnoide defunctorum individuum cadavera, 48 substantiæ cerebri mutationes morbosæ præbuisse narrant. (Ad hoc esse sine dubio et illi Arachnoïdæ pertinent, qui sopore et paralyti comitati sunt!) Dein avertio illorum in plurimis casibus in superficie arachnoïdæ pias extensus ab illis observatum fuisse, a veritate procul esse videtur; nam resultado illorum propriarum observationum nullatenus respondit hoc factum, quoniam intra quadraginta duos casus, quos ex illorum necropsopiâ Georget fortuito extraxit et perbustravit pias in superficie Arachnoïdæ quæque schemmado, et e contra in iisdem quinquaginta observationibus 52 vicibus pias mater injecta, sanguine scatens et fluido sanguineo-seroso, seroso-purulento aut ichoreoso imbuta, quod usque ad finem Anfractuum expandebatur; 26 vicibus cerebrum partialiter vel totaliter emollitum; 13 vicibus hoc organon injectum et sanguine tectum et sic porro animadvertebatur. Circa 77 observationes narratur organon cerebri sicutum et perfecte sanum fuisse; e quo elucet cerebrum morbosum desorganistum esse debere! Sub 80 vero observationibus arachnoïdæ perfecte sana observata fuit.

Hi casus, quos nos scopo hancenticitatem relationum dominorum Parent et Martinet de-

monstrandi adducimus, tanta invincibilis argumenta pro rarissima apparitione Arachnoiditis substantivae sistent nobis videntur, ut auctoritate Professoris Boetan (1) confirmati declarare nullo haesitemus momento *Arachnoidem in Pathologia speciali proprio non esse articulo, sed sub meningitide intelligendam esse.*

Prius quam ad morbi divisionem procedamus, quae ex objecti nostri natura sponte exoritur, quaestionem: An, nempe, cerebri et medullae spinalis meninges ad illas organismi partes, quae inflammationsi subjectae sunt, pertineant, vel non? respondebimus.

Cum secundum unanimum auctorum consensum, inflammationis natura in processu vitali aducto, et sanguinis plasticitate, etiam non semper in toto organismo (febris) ad minimam tamen in parte affecta, exuberante consistat, nemmo declarando eas elucidando organismi partes,

(1) In son poëme este hoministe opere cités dans cette introduction quantitative, sic célèbre dans vie, pagina 163 sequentia sunt illa: « Nous ne cherchons pas à établir de différence entre l'arachnoidite et l'inflammation de la pie-mère, bien que dans quelques circonstances, rares à la vérité l'une de ces membranes puisse être enflammée sans que l'autre le soit; leurs signes sont en effet les mêmes c'est pour quoi nous les comprenons l'une et l'autre sous le nom de meningite, ainsi que le fait M. Guérin dans le dictionnaire de médecine ».

quae vasis nervisque praeditae sunt, huic morbo subjectas esse posse inficias ibi, nam proprietates, uti sunt: dolor, temperatura adacta, caeteraque omnia; quae inflammationem stipant, symptomata, illis tantum in partibus, quae nervis, vasisque sanguinea, quae vitalitatis sunt foci, superbiunt, manifestari possunt; vitalitas enim exaltata (inflammatio) praesistentiam vitalitatis supponit oppositi.

Meninges cerebri, medullae spinalis ed tales spectare partes, contrariis non obstante Professore Rudolphii quaedamque medicorum observationibus, est pridem jam explorata veritas. Tam mentis sagacitate, quam doctrina, experientiaque excellens Professor Sachs, casus paulo ante scribo laudatam mentionem fecimus in suo eximio a nobis jam alibi citato opere hinc hoc objectum sequentibus describit: Ad Rudolphii praedilectae assertionem ille quoque, uti neminem latet, pertinet; membranas serosas generationem Epidermidis dignitatem habere, illas raris nervisque totaliter destitutas esse, humores per illas tantum transdari, nullatenus vero ab illis secerni, illas nullo morbosum processum idoneas, sed illud, quod pro hoc tenetur, morbos illis adhaerentem partem et per eam productas mutationes esse; quod ego Pleuritide, Peritonitide (sine dubio et meningitis) nominabatur, inflammationem tantum superficiei Pulmonum, Cordis, Intestino-

rum etc. etc. esse (in ejus Physiologiae Tomo primo, pagina 100 et sequentibus, nec non in multis aliis locis hujus docti operis). Creditur Rudolphi, hoc ratione hydropem Pectoris Pericardii etc. etc. explicari posse? Estne possibile ut superficies Pulmonum vel Cordis humores secerant? Reversè in certo sensu assumi potest membranas serosas vasis esse destitutas, quia cum Rudolpho ad illas paradoxiæ repi mittamur. Vas minutæ significationis est, quædam canalum, cavum format; ibidem tantum, ubi inscribitur, secerneat aut absorbens, idem videt, sua vitalis dignitas incipit. Nullo vero dubio obnoxium est multa præcipue secerneantia vasa membranis serosis inseri. Vasorum ad membranas serosas proportionem pulcherrime Gendria in suo opere, *La description anatomique de la phlogose*, per Doctorem Radium etiam in Germanicum translatus idioma et Lipsiæ 1828 editum, speciatim in Tomo primo pagina 38 et sequentibus exposuit. Sed præter hæc Rudolphum conamen, possibilitatem inflammationis membranarum serosarum negandi apud medicos practicos sine ullo fructu maneret, cum quotidie et clare de contrario persuadi possint, et tandem etiam debeant. Maxime vero contra ejus opinionem loquitur sequens factum: Schroederus van der Kolk (Vide ejus observationum anatomico-pathologici et practici argumenti fasciculum primum) Arach-

noidese vasa injectit, et hic reversa illusio minime locum habere potuit.

Celeberrimus Chaussier duram matrem ramis nervosis et quidem filis quibusdam, a gangliorum systemate venientibus, et arteriis, quae hic magno numero adunt, sese associantibus, praeditam esse, apodictice demonstravit. Praedictas autem arterias, uti in celeberrimi Hippolyti Cloquet eximio anatomiae tractatu descriptivo pagina 372 paragrapho vero 1545 legitur, sunt Arteriae meningae mediae propriae, arteriis maxillaribus internis et parvulis quibusdam ramis quos arteriae ethmoidales anteriores et posteriores, lacrymales, pharyngeae inferiores, vertebrales, occipitales et temporales suppeditant.

Præsentiam in meningibus nervorum atque sanguiferorum vasorum præter superius adductas Schroederi injectiones, circumstantis ea, illas etiam si vasa earum in statu physiologico oculos anastomorum fugiant, in statu inflammatorio intense rubere et aegros maximis trucidari doloribus, loculentissime demonstrat. In eximii operis dominorum L. Ch. Roche et L. I. Serson, quod tertia vice anno 1834 curis Doctoris Marini Bruxellis editum est, tomo primo, pagina 186 circa id sequentia adnotata inveniuntur : « Insensibles » dans l'état sain ? les membranes serueuses acquièrent une sensibilité excessive lorsqu'elles sont enflammées ; la douleur y est brillante, puis-

« gîtive, la rougeur est plus marquée, que ne la « fait voir supposer le petit nombre de vaisseaux « sanguins, qui pénètrent ces membranes » (M<sup>r</sup> Herclé res incredible, si absentiae vel tantum parvitatis vasorum sanguiferorum demonstrata fuisset)!

utitur vocat.

Maxima medicorum de meningitide disputantium pars eam sequenti ratione subdividit.

1) Secundum ejus sedem in meningitidem cerebralem et spinalem seu rachideam (meningite rachidienne, Rostan, Georget, arachnoïdite rachidienne L. Ch. Roche, L. I. Sanson et multi alii) nec non in meningitidem convexitatis et baseos Cerebri (Georget, Rostan, Parent, Martinet, etc.).

2) Secundum decursum, in acutam et chronicam, (quam multi, inter quos Roche et Sanson quoque observantur, sine sufficiente uti mihi videtur ratione Hydrocephalum chronicum, qui exitus meningitidis chronicae est, appellant) et

3) Secundum ejus symptomatum varium complexum, in puram et complicatam (Rostan, Georget, et fere omnes de hoc differentes objecto ceteri medici).

Non desunt tandem, qui illam secundum typum in continentem, remittentem et intermittentem (Roche et Sanson, a rachnite-quod illis pro meningitidis synonymo valet-intermittente

cerebrala, ou fièvre putrideuse céphalique, délirante, soporeuse, maligne, ataxique et sic porro) subdividunt; acd sine dubio a veritate aberrant, nam febrem malignam, ataxicam lervatam intermittentem etc. morbum inflammationi plane heterogeneum esse, res clarior est, quam ut ignorari possit, et nihil, quam aliqua symptomata cum illa communi habet; quomodo enim, si naturae ab illa inflammationis toto caelo diversae non esset, nullo alio medicamento, quam Chinas Cortice, ad antiphlogisticorum solventiumque ceteram me Hercle non spectante, sugari posset?

#### NOSOGRAFIA.

Secundum principia medicinae organicae, quam nos cuicunque aliae, uti sanae rationi maxime consentaneam, ex vera percussione praeferrimus, cognitio cujusdam organi et ejus functionum ad cognitionem symptomatum, quibus morbi ejus characterisantur, conducat oportet. Nota textus cujusdam laesione, quibus illa stipatur, signa neminem latere posse, cuique annuit sana ratio. Affectionem ventriculi a laesa progigni digestionem; cordis a norma aberrationes a circulationis erroribus praepriis denotari; et morborum pulmonalium symptomata principalia in laesa respiratione praecipue quaerenda esse, sponte elucet. Nemo igitur ad cognoscenda meningitidis



symptomata pro optima dactrice functionum meningum notionem declarare haesitabit.

Quo meningum functiones curiosis humanas excoelavit natura, velum hucusque Physiologiae ministri penitus detestare incassum tentarunt. Verum probo dolor est, hodierna adhuc die plurima hac in re latere, paucissimaque liquere; nihilominus tamen pauca illa, quae de hoc scimus objecto, bene perscrutata, ut multa elucescant, sufficiunt.

Quae vero circa praedictorum involucrorum functiones evicta habemus, sunt sequentia:

I. Meninges cerebrum contra influxus inimicos tuerentur, et

II. Fluidi serosi motibus praedicti organi faventis, percellam, quo stimuli quoque per ipsarum meningum actionem in cerebri substantiam producti effrenis infringitur via, secerant.

Ab normali functionum harum membranarum stato, normalem cum illis strictissime connexi cerebri quoque actionem necessario dependere nemo non intelligit, quae ex causa etiamsi meningis functionibus mentalibus nullatenus praesent, illis tamen laevis hoc quoque alterari debent. Ergo tam meningitis, quam encephalitis, symptomatibus functionum ejusdem organi laesionem demonstrantibus manifestantur; in eo tamen differunt, quod encephalitis, cum in illa cerebrum directe ergo profundius quoque laesum sit, functionum hujus

organi depressione, meningitis vero e contra propter stimulatorem per meningum turgesceniam et caloricam majorem emanationem in Encephalon agentium noxarum ad ductum, curata neque ad delirium exacerbatione stipetur.

Celeberrimos Rostan adnotat quidem meningum inflammationes, ipsas suppuratione terminatas, sine delirio observasse; sed cum tales casus rarissimi sint, et solummodo, uti ipse praedictus ait Auctor, in individuis senectute, quae ipse est morbus, confectis et forsitan cachectis quoque laborentibus monstrantur pro anomalis et pathologicis varietatibus potius, quam pro factis, quae nostrae a vicis auctoritatis ad segrorum lectulos observatis et anatomis pathologica confirmatis numerois casibus fulcitur Theoriae veritatem obnubilare valent, tentantur oportet. Quare nec cum tot et tantis medicis neutericis delirium meningitidis signum princeps et constans esse declaramus, etiam si et nostram non fugiat mentem delirium alios quoque morbos comitari posse.

Nunc vero phaenomena functionalia, sincere eoque ordine, quo ad segrorum lectulos sequi a fide dignis medicis vix fuisse narrantur, enumerare conabimur, quibus organica per hunc morbum productas mutationes quoque adjungemus. Ad symptomatum catervam vero oculis facilius percurrendam morbi decursum in tres subdivi-

dimas periodos et illas secundum contentorum in eam stadio symptomatum proprium characterem *exaltationis, inflammationis declaratae et depressionis seu terminationis* periodos nominamus.

Periodus *prima seu exaltationis*, si convulsivitas loborum cerebri meninges afficiantur, capitis dolore violenti, characteris particularis typique continui apud proles per clamorem proprii generis, quem Coindet clamorem hydrocephalicum, propter ejus cum ventriculorum hydrocephalo crebras apparitiones, nominat, sese manifestante annunciat. Haec cephalalgia mox frontis mox sinapis moxque occipitis regionem occupat, somnolentia excipitur et hac fugata cum majori saeva ferocia.

Memorata dignissimum atque pro Diagnostici sensui est memento; hunc morbum phaenomenis universalibus semper stipari quia haec inflammatio, etiam partialis appareat, ambo latera occupare observata est-rarissime enim meninges in uno latere tantum afficiuntur (Rostan).

Facies plurimum rubescit, rarius pallida emadescit, semper vero dolorem exprimit, oculi adparent sanguine injecti, splendentes et sensibiliter aerem usque ad photophobiam exaltata est, quare palpebrae clauduntur. Aegroti scintillas, scotomata volantesque diversi coloris et figuram mutantis particulas vident, sicut, dolo-

res atrocissimae, praecipue in regione frontali residentes accedunt, tinnitu et susurre aurium molestantur, dentibus strident, impatientes evadunt, et breviter confusaeque ad interrogationes respondent. Calor cutis adhaesit, lingua sicca, rubra, sitis magna, circulatio accelerata, respiratio vero languens observantur. Ab initio morbi vomitus fere semper apparat, sed dolor epigastriacus, quo Gastro-Enteritis characterizatur, cum numquam comitari visus est. Alvus, si morbum Enterocolitis, quod apud proles saepius observatur, non praecesserit, fere semper obstipa immo-advertitur; urina raro emittitur, hinc sedimentosa.

Frequenter evenit, ut haec prima morbi periodus apud senes desideretur. Aegri uno quasi ictu, uti in congestionibus accidere solet, conscientia privantur, sed post hunc eventum semper motus febriles, quibus hic morbus a sanguinis versus Cerebrum fluxu distinguitur, manifestantur.

Periodus secunda seu inflammationis declaratae feroci clamoresque delirio, postquam praedicta symptomata per duarum vel trium dierum nonnunquam longius quoque temporis spatium perduraverint, intrat, quo vigente aegri element, agitantur, in adstantes spouit, dentibus strident, minas jactant, lectulam deserere atque sub blasphemis manus sibi aliisque inferre conantur. Actiones illorum in hoc stadio robore laetius

atque animo maligno characterizantur. Dolor capitis adaugetur, intensior atque acutior evadit. Facies atque extremitates motibus convulsivis et tendinum subnitis comprahenduntur; oculorum caeterarumque sensuum sensibilitas imminuitur, pupillae praeter normam aut dilatantur aut contrahuntur, aegri autem in aetate infentili versantes strabismo saepissime molestantur. Pulvis plus vel minus evoluti, saepius irregulares et trementes, rarissime vero normalibus debiliores et lentiores in hac epocha animadvertuntur. Lingua semper rubescit, sitis est adacta et vomitus nonnunquam persistit.

Periodus tandem tertia seu depressionis et terminationis, symptomatibus, quae depressionem universalem denotant, characterizatur. Clamores cessant, carphologia manifestatur, motus convulsivi atque contractiones praecipue in membris thoracicis apparent, pupillae dilatantur et oculi pro iactamentis ordinariis insensibiles evadunt, in illorum orbitis rotantur, delirium clamorosum a silentio terribili excipitur, et quaestiones ab aegris non respondentur. Usque ad hoc momentum somnus fugebat hos infelices, nunc illos modo excessivo obruit, trunci examini adhaerent immoti contractis jacent membris. Effectus effusionis humoris serosi, quae membranarum serosarum inflammationem sequi solet, constat hic status est; sed et injectio cerebri simplex aut ejus

per diversas causas compressio eum producere valent.

Facies in hoc stadio pallida, et decolorata invenitur; oculi turbidi, pulverulenti; semiclosedi; versus partem superiorem convulsi; nasus attenuatur; aures frigidae; labes siccae, dentibus adtracta; lingua brunascenti et sicca; deglutitio difficilis et nequaquam strepitosa, quae haud raro cum toxicula nausaeque perficitur; et propter fluidorum ob deglutitionem impeditam in glottidem transitum rectibus stipatur; meteorismorum denum et faeces egro inconsue eliminatae observantur.

Cutis est frigida vel odore viscoso tecta; respiratio autem rara, saepiusque stertorosa. Quando morbus sanitate terminatur, descriptorum symptomatum intensitas gradatim decrescit vel resolutio rapide cum vel sine phaenomenis critica perolvitur. Sub sinistra vero rerum adjunctis, ut odor frigidus extremitatumque gelus cum respiratione stertorosa, aut intensae Convulsiones, quod praecipue apud infantes animadvertitur, mortem annuntiant.

Haec sunt meningitidis haemiphasarum cerebri acutae symptomata principalia. Adnotandum tamen venit, acerbationis ejus momenta valde irregularia esse; cutis et faciei colorem sine causa manifesta saepius variare, periodosque ejus minime, constantes et fixas animadverti.

36

Si meninges ad basim cerebri inflammantur, tunc phaenomenorum illorum, quae exaltationem denotant, intensitas, diminuta observatur. Levisimum adest delirium et aegri lente quidem, sed juxta tamen ad interrogationes respondent, quod signum manifestum est, aliis functionibus minus laesa attentionem solummodo depressam esse. Cum vero caetera phaenomena morbos capitis illa meningitidis leborum cerebri acutae coincident, illa, brevitatis causa silentio praeteribimus. Causam vero hujus meningitidis varietatis in relative minori partium inferiorum cerebri sensibilitate vel fluidi serosi in meningibus illarum majori acretionis quaerendam esse, credimus.

Inflammatio involucrorum medullae spinalis (meningitis spinalis quam Galli meningite rachidienne appellant, raro sola, sed saepius cum meningitide cerebri conjuncta et hanc symptomatibus quoque hinc propriis stipata observata fuit. Abtractis vero communibus praedictis symptomatibus, phaenomena inflammationi membranae propriae medullae spinalem obvolventis sequentia adnotari possunt: Contractio musculorum dorsali, capitis et trunci posteriorum versio (epistrotismus) et columnae vertebralis secundum ejus integram longitudinem in formam speciei arcus inflexibilis incurvatio. Adnotandum est, sub meningum basim cerebri te-

gestium inflammatione, portionem cervicalem medulla spinalis quoque postroctum flectit; sed tunc ceteros truncus suam naturalem directionem conservat. Porro ad signa pathognomica meningitidis spinalis, dolor particularis molestiae variabilis in directione columnae vertebralis exsurgens, et per integram dorsii regionem sese expandens, cujus typus saepissime continuus, variis remittentis, rarissime vero intermittens observatus fuit, sub compressione exacerbandus spectat. Doct. Olivier, aegros sub minimo corporis motu, ob dolorem sacriticum debiles clamores emisisse observavit.

Meningitis chronica saepissime acutam sequitur; nonnunquam tamen evenit, ut jam ab morbi invasionis symptomata characterem chronicum praeseferant. In plurimis casibus cephalalgia continua observatur, somnolentia, hebetudo, intellectus obscuratio et morositas existunt; vox halbuta, idaeae confunduntur; delirium nonnunquam in somnum prodit, et in speciem idiotismi transit. Motus lente et difficulter perficiuntur; membra motibus involuntariis agitantur, et eorum servitium recusant; rarissime vomitus et motus convulsivi manifestantur; functiones vitae individualis neque ad morbi ultimum tempus et paulo prius, quam mors secuta fuerit, nullas praebent mutationes.



Primis morbi diebus meningum injectio manifesta observatur, sed ab illa, quae a plethora sine nota inflammatoria producitur, essentialiter differt. In congestionibus cerebralibus vasa sanguine impleta inveniuntur, et illorum ramificationes persequi possunt. Si individuum quoddam cordis affectione necatur, haud raro evenit ut cerebri vasa sanguine nigro impleta inveniantur, ab in cadaverum investigationibus minus exercitata haec observatio pro inflammationis effectu facillime interpretari potest, et hic error tanto expeditius committetur, quo hic quoque, uti in meningitide, effusiones serosas praesto haud raro observentur; sed symptomatum meningitidis, quibus morbus praecursus stipari deberet absentia et cordis affectio progressa omne delebunt dubium. Separatae a cerebro membranae intensius rubescunt, quis hac ratione vasa illarum magis appropinquantur, quod tam in meningum inflammatione, quam in congestionibus cerebralibus observatur.

Injectio inflammatoria sic uniformis et sequabilis est, ut membrana integra sanguine impraegnata esse videatur. Post aliquot dierum spatium arachnoidea sua pelluciditate orbatur, tardius consistentior credit, manibus difficiliter laesatur, sed celeberrimus Rostan jure dabit, illius pondus

revera autum esse, argumentum dicens, pleura ponderis augmentum quoque illusorum esse, illudque per suppositam pseudomembranam formari; nam illa detracta pleura primitivam suam consistentiam et pellaciditatem recuperare visa est.

Ab initio morbi membranae, siccæ, et cerebri organo tam adnatæ inveniuntur, ut ab eo separari nequeant, et si vi detrahantur, cum illis simul substantiæ corticalis Cerebri portio extrahatur, etiamsi cerebrum neque emollium, neque, rubrum, uti in vera Encephalitis, colore punctatum observetur.

In studio tertio inter arachnoideam atque pia materem fluidum serosum ad gelatinæ consistentiam condensatum videtur; hoc effusum ad ventriculos atque basin cerebri neque, extenditur, et turbidum puroque consistens esse fertur; quantitas vero ejus variat. In gyrorum intervalles quoque accumulatum invenitur pus, sed non-assuetum coloris rubeo-purpurei fluidum quoddam ejus supplet vices, quod pro fluidi serosi cum vero sanguine mixtione tenetur. Hoc cum calidissime Postea sanguineam hanc effusionem pro morbosa exhalatione nullatenus agnoscamus, sed pro sanguine e vasibus ob ætrem magnam turgentiam ruptis effuso et fluido seroso commixto tenemus.

Post meningum vero inflammationem chronicam

cam, eas incrassatas atque albedine margaritina nitentes parvulis granulationibus, et vere tuberculis, quas in tectis in et sub arachnoides praesenti vel infra illas retident, repleta animadvertuntur.

Genuina paraque cerebrum atque medullam spinalem obvolvuntium membranarum inflammatio paulo ante descriptam imaginem praestari; sed evenit saepius, ut illis morbis complicetur, quo in eam symptomatum catarra ingrat, et secundum morbi complicantis aetatem variat. Haec loco illos morbos, qui cum meningitide saepius connubium inire visi sunt, nominatim aliquammodo adducimus; specialia vero phenomena, quibus unusquisque eorum manifestatur, nam brevitate tenet, quam hujus operculi exoptat scopus, quam propter complicationum naturam nullatenus enigmaticam, omittere censimus.

Complicationes meningitidis cum digestionis, et respirationis morbis inter ceteros omnes saepissime occurrunt. Meningitis quae pleuritide, nam saepissime praecedente, conjuncta, a multis clinicis observata fuit. Quaesit, proles phthisi tuberculosa pulmonum laborantes pluries meningitide haecque cerebri mortuae fuisse, observata. Meningitidem cum diversis quoque efflorescentiis cutaneis acutis complicari posse, summe probabile est. Quaesit tamen in dictionario me-

dico, hanc complicationem in proliis duorum usque quindecim annorum nunquam observasse asserit, nos vero, hoc non obstante, observationum aliorum, contraria defendentium medicorum veritatem in dubium non tantum nullatenus trahimus, sed in illorum opinionem potius inclinare consistimus. Enteritis tandem meningitidem habenter praecedit et comitatur.

#### ARTICULUS.

Nullum temperamentum, nullus corporis habitus, sexus nullus, aetasque nulla contra meningum inflammationem prophylactica gaudent virtute; temperamentum tamen cholericum, plethorica corporis habitus, sexus masculinus aetasque infantilis et juvenilis praecae ceteris majori in hunc morbum proclivitate excellere videntur, quamvis id, cum in eo medicorum adhuc discrepent opiniones, cum certitudine asseri non potest. Secundum D.D. Parent et Martinet setatum tabellam meningitis in aetate, quae inter quindecimem et inclusive sexagesimum annum versatur, saepius quam in proliis quinque usque quindecim annorum observatur. Juxta eorundem medicorum observationes morbus hic viros quoque saepius quam feminas ingreditur, quoniam inter 116 causa 88 mares numerandos esse affirmant; e contra vero celeberrimus Quer-

sunt sexum foemininum in aetate infantili versantem inflammationse basili verbori urgentem membranarum chibris matricis laborare avertit, sed in eo et ille convertit; hunc morbum in adultis apud matres commensuram quam apud foeminas esse, cum jam illorum foetior corpora constitutio illis ad morbos inflammatorios magis praedispomat. Idem auctor hanc hyperaethesiam in aetate infantili neque ad pubertatis annos terribillime grassari, suis propriis observationibus evictum habere asserit.

Causae vero occasionales meningitidem producere valentes, sunt sequentes: Percussio crani, insolatio, phlegmiae acutae vel chronicae cerebri, capitis a capitis denudatio (1) refrigerium summum, erysipelas faciei vel generatim cujusunque efflorescentiae cutis inflammatoriae praesentia et ad interiora repulsio, ignis super caput applicatio, tinea per remedia repulsiva valde rapido fugata, otitidem apud proles sequens suppuratio, omnes dolores violenti, dentitio difficilis, spirituosorum, potus arabici, quique abusus miasmata quae Typhum et febrim flavam producere valent, membranarum mucosarum,

(1) Vide, in danti Hasselendi tom. XVI fascicul. III. pag. 67, articulum sequentem: Ist die Alackhaide des Menschenhaars und des Bartes eine der Mode zu überlassende gleichgültige Sache? von G. J. Meibei.

sero etiamque diversorum organorum, inflammatio, et tandem omnes ceteras inflammationem producentes causas, si in meningem regionem agant.

.. Causae vero meningitidem chronicam provocantes, magis latent. Notum tamen est, eam capitis lacionum, cranii neomatorum, compressionum et organorum digerentium affectionum erythro, saepissime vero meningitidis acutae sequelam esse.

.. Causae autem meningitidis spinalis particulariter ignorentur; illud tantum patet, eam ab forficis, contusionibus, membranarum puncturis et vertebrae carie saepius productam fuisse.

Meningitidis comitantibus phaenomenis, et eam producentibus causis explicatis, morbi quoque ei similes, una cum signis particularibus eam ab illis distinguantibus, ut, quibus diagnosi ejus premitur, difficultates omnes evanescant, adducantur oportet.

---

MORBI QUIBUS MENINGITIS ACUTA CONFUNDI  
POSSET.

Cum phaenomena meningitidis functionalia cum illis, quae morbos acutos cerebri stipant, ut in nosographia demonstravimus, coincidunt, hi

cum illa facillime commutantur. Ad praedictos vero morbos congestio cerebrialis, encephalica, haemorrhagia atque emollitio inflammatoria cerebri numerantur.

Cum meningum phlogosis cum congestione cerebriali, et encephali ejusque involucrorum statu irritativo propter symptomatum magnam analogiam, inter omnes adductos morbos facillime confundi possit, et hic error scaturiginem tantorum discriminum sistat, hoc praecipuis nostra attentio vertenda est. Multi medicorum in omni cerebri irritatione Encephalitidem vel Meningitidem vident, et in sanguinis emissionibus, quod praecipue sub caelo calidiori consuetudo erexit, infatigati sunt, atque hac ratione cachexia, et cachexialis haud paucis sterment viam. Multi, ut celeberrimus Moret asserit, credunt nullam febrem, quoniam secundum Broussais condemnabilem Theoriam illi inflammationem semper supponendam esse affirmant, sine generosissimo antiphlogistico apparatu sanari posse. Quomodo in Nosocomiis Gallicis sanguinis emissiones larga instituuntur manu, et contra ipsas debillimas puerperas nullus habetur respectus ex facto multas gracilium febris puerperali laborantium puerperarum in Nosocomio Maternité dicto adhuc anno 1823 hoc modo sacrificatas fuisse, houlenter elucet. (Vide Tonné in archiv. générales de médecine Tom. XXIII. mensis Martii et Aprilis).

In sectione mensis Maii hujus diarii, pagina 41 sequentia leguntur: « Les applications de sangsues se faisaient, constamment sur le ventre au nombre de quarante, quelquefois mêmes soixante et fréquemment elles étaient répétées le soir et le lendemain, si l'amélioration n'était pas évidente; il arrivait ainsi très souvent qu'on en employait plus de deux cents (!!!) chez la même malade (puerpère) dans l'espace de trent sex du quarante huit heures » et non obstante aspersissime tertio jam die morte subsequuta in hac curandi methodo (?) perseverabatur! — Sed hæc vampyrea in sanguinem humanum sitis et medicorum Germanicorum, sanguinem secus abhorrentia cœda modo haud intelligibili occupavit! — Etiam ibidem humerosas hircinorum cohortes ad minimas sanguinis congestiones suffragandas, immemores et vitæ vim eliminari, adoperantur medici. Jure hæc celeberrimus Horn in suo archivio anni 1855 mensium Maji et Junii pagina 379 sequentibus verbis hæc deleterium accusat abusum: « Terminas encephalitis hodierno tempore vadoptere substituit. Irritatio cerebri cum calore aducto capitis et phantasias ludis, quæ pro encephalide tenetur, haud raro apud proles et juvenes cum synocha gastrica occurrit. Secundum præceptam ideam quotidie adoperentur sanguiisugæ, si usum liberum in clinica non denudissem mea. Media solventia et purgan-



lia nec non parca fomenta frigida ad perfectam suffecerunt sanationem ».

Ex adductis, quomodo in sanguinis emissionibus, si curae nostrae committoramus, negotium nobis cordi est salus, cautos esse oportet, luculenter evanescit. Quare, ut fatalis hic evitetur error, in inflammationis rite evincendae diagnosi ad symptomatum raris indicantium integram completionem, ad illorum intensitatis gradum, nec non, quibus morbis productus fuit, castas convertenda est attentio.

Symptomata inflammationis constantia, intensitate et ininterrupto cursu manifestantur, cum e contra in congestionibus atque in sic dicto stata irritativo fugacitate et levitate stipentur; hinc febris inflammatoria, phaenomenorum gravitas et longior duratio — nam congestiones plurimis in casibus jam inter 12 vel 24 horas dissipantur — tam cerebri quam meningum inflammationi conveniunt, in congestione vero desiderantur.

Praeterea congestio, quod cum extravasatis commune habet, rapidissime nonnunquam intra paucorum minorum spatium, evolvitur; inflammationem vero signa prodroma praecedunt (vide nosographiam meningitidis).

Ad causas demum meningitidem producentes (vide aetiologiam meningitidis) animi commotiones, influxusque quicunque psychici-staturigines principales congestionum nos spectant; nos in-

inflammatio meningum, quae uti malum materiale semper consideranda est, quæ talis solummodo ab illis influxibus provocari potest, qui magis materiem et ejus mixtionem quam dynamis alterari queunt.

Meningitis ab Encephalitis vero per eorum phaenomenorum, quæ functionem mentalium evolutionem, uti sunt: delirium, adaueta eorum aliorumque sensuum susceptibilitas, dolores acuti violenti convulsiones, hisque similia distinguuntur, nam cum Encephalitis symptomata, a profundiori sed minus dolorifera cerebri læsione dependant, his penitus opposita sunt, et quidem extremitatum contractionibus, sopore et paralyti mox completa mox incompleta aut universaliter aut particulariter apparente, manifestantur. (Vide præcedentem meningitis nosographiam). Celeberrimi Doctores Lallemand et Boissier prædicta symptomata Encephalitis pathognomonica esse jam pridem demonstrarunt et clarissimus Bouillaud confirmavit. Meningitis cum encephalitis vel emollitione cerebri complicata solummodo, citatis phaenomenis manifestari visa est, sed paræ semper signis toto cælo differentibus stipatur.

Morbi ingressus intemperatus, tumultuosus præcipue in individuo ad illud usque momentum optima gavisio saluti, habitusque plethorice prædicto, et morbo jam evoluto, phaenomeno-

rum, quae depressionem vitalitatis indicant, manifestatio, haemorrhagiam cerebralem praescriptis characteribus.

Emollitio tandem cerebri per phaenomenorum functionalium lentam et gradatam evolutionem, febris absentiam, in multisque casibus manifestam dispositionem scorbuticam eam comitantem manifestatur.

Henke avertit, meningitidis symptomata cum illis, quae enthelminthum in organismo praesentis probare valet, confundi posse; sed talem errorem nunquam commissum fuisse difficillime revera intelligitur, quia cephalalgia, pupillarum dilatatio, vomitus et convulsiones ipsae, symptomata nonnunquam per vermes intestinales producta, nunquam uti in meningitide constantia observata sunt, neque febris cum respiratione respirante et inaequali ea procedit, nec comitatur; tandem quoad decursum morbus verminosus cum meningitide plane nullam praebet analogiam.

Ad morbos meningitidis similes posset mania quoque numerari; sed praeter tam febris, quam ceterorum inflammationem denotantium symptomatum absentiam vix cum illa confundetur.

Inflammatio membranarum medullam spinalem obvolventium acuta, cum acutis medullae spinalis phlogosisbus magnam praebet analogiam;

sed per illam membrorum inferiorum actionem, quæ in myelitide plus vel minus torpida observatur, distinguitur (Olivier).

#### DE MORBO MENINGITIDI CHRONICÆ CERVICIS.

Omnes morbos cerebri affectiones, quæ functionibus mentalibus læsis, dolore capitis, atque lento stuporibus cursum, primo obtutu cum cerebri involucrium inflammatione chronica confundi possunt. Ad morbos prædictos cancer, tuberculaque cerebri, porro crani exostoses internas, et a præsentia hydatidum cerebri producta male spectant, sed illorum symptomatum primo momento apparetis analogia, sub scrutatorio intensiori attentione facillime evanescit.

Hydropem ancephali chronicam inter cum meningitide chronica quosdam analogiam habentes morbos non adduxi, quia illæ meningitidis effectum sistit, atque tali ratione uti ab illa differens morbus considerari non potest.

Existencia canceri cerebri, per capitis dolores lancinantes, cutis pallorem, in brachio parti capitis affectatæ opposito punctiones, præcursam vel præsentem pectoris aut testiculorum, si patiens ad masculinum aut uteri, si illa ad foemineum pertinet sexum, cancerosam affectionem, et tandem per ætatem ægri evincitur; nam neminem latet, a cancro adultæ vel senæ solum-

modo affl<sup>o</sup>, individua vero juvenilia ab hoc morbo excepta esse. — *ad* 3. *ad* 4. *ad* 5.

Tubercula cerebri in juvenibus, tubercula ad alia organa laborantibus, suspiciuntur.

Interne crani exostoses comprimendo cephalali illis correspondentem partem, tumorem, paralyticum etiam effectus imbecillitatem producant; tapantur vero fixis doloribus ad cranium osteocephalicis, illorum tempore nocturno per lectuli calorem augmento, nec non sub certis atmosphaeræ conditionibus exacerbatione.

Sine processu, meningitidem chronicam producere valentibus, causa, evolutio ejus, et populatorum morborum absentia, ad hydatidum cerebri presentiam concludendam conducunt.

Inflammatio involucrorum medullae spinalis chronica cum praedictis morbis chronicis, si inter columnam vertebralem resident, communi, sedemque signis pathognomonicis (intelligitur mutatis mutandis) distingui potest; nam cancer, tubercula, tumores cistici interni et hydatides medullae quoque spinalis existunt. Uti in meningitide cerebri chronica ita et in spinali ex superius data causa de illius hydropse nulla fit mentio; sed morbus quidem chronicus medullae spinalis, tabes dorsalis nempe, adhuc superest, qui fortitan cum ejus meningitide diuturna confundi potest sed talis error aut ab ignorantia summa, aut ab attentione dissipatissima committi



Mania, furor, hydrocephalus, hydroscabies, et secundum nonnullos observationem, pneumonia quoque, sunt morbi, in quos inflammatio cerebrum et medullam spinalem obvolvendum membranarum saepe transire animadvertebatur, sed ea etiam pro vetis licet depulsa, aegrotus tamen ad longum tempus vertigine, dolore oculorum capitis, memoriae debilitate, auditusque acutis aut gravitate laborat.

Mors vel meningum appositione vel apoplexia serosa aut sanguinea exsequitur, et inter triam, quatuor aut triginta nonnunquam dierum spatium intrat. Individua hoc morbo correpta rarissime ante quartam aut quintam diem mortui fuere observata sunt. Querebant mortem usque ad 28 diem protractam vidisse asserit, et Parent atque Martinet exemplum de quodam meningitide laborante viro, qui trigesima prima die mortuus est, adducunt. Saepissime vero hic morbus inter duas vel tres septimanas terminatur; cum autem phaenomenorum ingressum stricte definire res difficillima sit, ideo durationis morbi tempus appropinquative tantum designari potest.

Signa, quae deleterium exitum denotant, sunt sequentia: masticatio perpetua, stridor dentium, deglutitio laboriosa, valdeurgens hâlis aeroginosa vomitus, pervigilia protracta, tendinum subsilius, urinae tenues, crocae, spasticæ et faeces albescentes.

## THERAPIA.

*In tractanda meningitide sequentes  
exsurgunt indicationes.*

1. Causae, quae eam produxerunt, adhuc vigentes amovendas, vel si amplius amoveri non possint, omnia quae morbum exacerbare valent, evitanda.

2. Phlogosis debellanda.

3. Minans encephali vel columnae vertebrae hydrops praecavendus.

4. Convalescentia curae dirigenda.

Ad primam curae indicationem explendam, debent incipiente meningitide laborantia, vel ingressum ejus indicantibus sollemniter symptomatibus afflicta individua locis, in quibus ipsae nocentes, uti calor excedens, frigus nimium etc. agunt, auferri, vel a morbis aliis cacteris, quae a nobis in aetiologia jam explicatis, eam clare minantibus conditionibus liberari, et spatiis, in quae stimulis sensibilitatem nimis exaltantibus, uti sunt lux, aestus, strepitus etc., non conceditur aditus, collocari; nec non tam pro vipe huic statui congruo genere, quam pro dolci et humano e parte aegro assuetudinem tractationis cura geratur oportet.

Si autem praedictis praecautiōibus meningitis phlogosi via occludi nequeat, postquam aegrotus





rem commendaverimus, ex eadem causa in meningitide spinali venae cephalicae eademque sectionem. Praeter usque ad manifestam functionum mentalium morbose exaltatarum depressionem repetendas phlebotomias ad colla regionem, post aures, ad usumque praecipue cavitates, nec non si depressae haemorrhoides cum inflammatione in aetiologicalo stent nexu, (Vide aetiologiam et exitus meningitidis) ad anum hirudinem, cucurbitarem, et scarificationum applicatio summum producit emolumentum.

Observatum est, quo sanguinis major quantitas inter minus temporis spatium evacuata fuerit, eo meliores successus obtentos habere, intelligitur tamen quantitatem sanguinis emittendi, si optatus desideretur effectus, secundum morbi gradum et aegroti vires, esse dirigendam.

Praedictae sanguinis emissiones cum pediluvio calido vel simplicibus vel acido hydrochlorico, sinape, potassa, sale et aliis efficacibus particulis impregnatis materiae optime combinantur. A nonnullis synapismi atque vesicantiae ad pedes et morbae regionem cum utilitate applicantur, et quae illorum actio diutius durat, majori, quam pediluvia agunt efficacia, sed in individuis magis irritabilibus, et plethoricis saepius nocent quam juvant, hinc sub hoc rerum statu evitari debent. Glaciei atque fomentorum frigidorum cum nitro, sale ammoniaco et aceto remixtorum ad caput

56

applicatio continua indispensabilis est, mercuriales tandem usque ad salivationem, inunctiones jura a tot excellentibus practicis ad sidera usque elatae esse videntur.

Omibus interne propinatis medicamentis Calomel palmam rapuit; si organa digestionis irritata non sint, hoc medicamentum in Tubi gastro-enterici membrana mucosa salutarem revulsionem producit. Purgantis salina, oleum Ricini, proutorum nigrorum syrupus, Tartarus emeticus in dosi refracta, et his similia aequali agunt modo, sed an eadem quoque efficacia jure dubitatur; hinc illis Calomel semper praefereendus est.

Quando digestionis organa irritata sunt inflammata inveniuntur, potus emollientes, attenuantes et solventes cum sanguinis gastro-enterici depletionibus et diæta duriuscula ordinari debent; illis vero sanis, juscula e pullorum, aliorumque juniorum animalium carne parata concedenda sunt, nimis serviente tamen inflammatione etiam sub hoc rerum statu omnium ciborum abstinencia iudicata est. Administratio praeparatorum opii semper nocens; moschi et aetherum autem minimae efficacitatis observata fuit.

Tractamen meningitidis cerebialis chronicae eadem, quibus meningitidis acutae fulcitur cura, principiis fundatur. Locales tamen sanguinis emissiones sanguisugis vel cucurbitulis post su-

res ad collum, ad narices positis adoperandas generalibus angulata evacuationibus semper preferri debent, præcipue si proles curandas veniant, et cum medicamentis revolventibus combinantur oportet: ad eorum catervam vero vasicantia volatilis, acetum ad regionem nuchæ, mox temperata secundum Doctorem Regauii methodum ad caput, et cæcarbitas sicca vel sanguinea post aures applicandas, spectant. Interne ordinantur purgantia refrigerantia, inter quæ Calomel præcipuum.

In minante hydrocephalo, qui per gravem annuncietur somnolentiam, media diuretica et inunctiones mercuriales laudantur.

Meningitis spinalis universalibus et localibus sanguinis emissionibus quoque curatur, secundum in tractamine meningitidis cerebialis exposita principia. Hirudines magno numero ad ambo columnæ vertebralis latera applicantur, præterea balnea frigida univcrsalia et topica instituantur, vesicantia, et si inflammatio in chronicum inclinet cursum, cauteria et mox administrentur; interne vero potus emollientes et purgantes cum diæta valde streuosa propinantur.

Pugatio morbo in potibus subacidis, medicamentis lenientibus, evacuantibus, refrigerantibus et diureticis, præcipue, si nimis in somnum inclinent aegri, continendum, et paulatim ad amaricantia, præparatis sub digestionis officinae de-

bilitate, transcendam. Cibi pauci, laeves, facile digerendi et antiplogistici cum pota reficiente, subacido, frigidiusculoque ordinentur, et omnia, quae sanguinis circulum accelerare valent, evitentur; nam experientia edocti sumus, aegros sub minimo quoque causarum impulso, recidivis indolis peioris saepissime succumbere.

## THESES DEPENDENDÆ

### I.

Pulsa fallacissimum signum diagnosticum.

### II.

Phthisis pulmonalis ad morbos incurabiles non pertinet.

### III.

Specifica non dantur medicamenta.

### IV.

Secundum clima, et medendi methodos variet oportet.

### V.

Vermes intestinales plurimum, morborum, quam hucusque creditur, sistunt spaturiginem.

### VI.

Aqua frigida, secundum artis medicæ sanæ principia adhibita, in plurimis morbis efficacissimum medicamentum.

## VII.

Argumenta a priori in medicina nihil demonstrant.

## VIII.

Ratiocinationes in medicina tantum ad experimenta conducere debent.

## IX.

Pneumonia doctibus magnis Tartari Emetici quandoque bene curatur.

## X.

Musices in morbis nervosis salutifera vis non spernenda.

## XI.

Oleum Euphorbiae, oleo seminum Croton tigliæ, semper præferendum.

## XII.

Timor ad morbos non tantum prædisponit, sed sæpius ad illos producendos sufficit.

## XIII.

Potassa et Soda, propter eorum nimiam irritantem vim, in toxicatione per acida concentrata inducta a magno medicorum numero ad summum segroreum damnum magnesias substituuntur.

## XIV.

Remedia sic dicta prophylactica semper damna sunt; hinc rejicienda.





1. 1. 1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.